

A cardiologia perde Alair Rocha de Castro

O cardiologista Alair Rocha de Castro morreu dia 21 de abril no Hospital Aliança, em Salvador. Tinha 62 anos e estava internado havia 40 dias para tratar um câncer no intestino. Ele passou por duas cirurgias desde o diagnóstico da doença. O enterro foi no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana. O médico deixou quatro filhos, dois que seguiram a carreira do pai, Jan e Lara.

O cardiologista fez residência, em São Paulo, no Instituto Dante Pazzanese e o presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), Ari Timerman, lembra-se, com muito carinho, do colega. “Fizemos residência juntos entre 1972 e 1973 e Alair era um excelente profissional, reconhecido pelos demais colegas. Sempre se destacava pela dedicação que tinha pelos estudos”, conta. Timerman diz que o médico

poderia atuar em qualquer grande centro, mas preferiu voltar à Bahia e trabalhar em Itabuna, no interior do Estado.

O ex-presidente da SBC, Gilson Feitosa, conterrâneo de Alair, recorda que o colega foi muito importante para o desenvolvimento da cardiologia em toda a região de Itabuna. “Era um médico muito dedicado à profissão”, resumiu.



Tabagismo tratado no lugar certo^{1,2}

CHAMPIX* O poder para parar³⁻⁷

tartarato de vareniclina

12
semanas
de tratamento
completo^{3,4}

Champix* oferece chance 16 vez maior de permanecer abstinente após um ano vs TRN, quando comparados ao placebo⁸

4x mais chances de parar comparado ao placebo^{3,4}
(odds ratios (OR): Gonzales et al = 3,85; Jorembj et al = 3,85)^{3,4}

2x mais chances de parar comparado à bupropiona SR⁴
(odds ratios (OR): Gonzales et al = 1,93; Jorembj et al = 1,90)^{3,4}



Fale Pfizer
0800-16-7575
www.pfizer.com.br
fal@pfizer.com.br

Referências Bibliográficas: 1. Raw M, Andersen P, Baïra A, for the World Health Organization European Partnership Project to Reduce Tobacco Dependence. WHO Europe evidence based recommendations on the treatment of tobacco dependence. *Tob Control* 2002; 11:44-46. 2. INCA (Instituto Nacional do Câncer). Website: www.inca.gov.br. 3. Gonzales D, Remard SJ, Nides M, et al, for the Varenicline Phase 3 Study Group. Varenicline, an $\alpha_4\beta_2$ nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2006;295:47-55. 4. Jorembj DE, Hays JT, Rigotti NA, et al, for the Varenicline Phase 3 Study Group. Efficacy of varenicline, $\alpha_4\beta_2$ nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2006;295:56-63. 5. Tonstad S, Tannensten P, Hajek P, Williams KE, Billing CB, Reeves KR, for the Varenicline Phase 3 Study Group. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2006;296:64-71. 6. Gillian M, Keating, M, Asif A, Siddiqui. Varenicline: A Review of its Use as an Aid to Smoking Cessation Therapy. *CNS Drugs* 2006; 20 (11): 945-960. 7. Bula do produto aprovada pela Anvisa. 8. Ping Wu, Kumanan Wilson, Popey Dimoulas and Edward J Mills. Effectiveness of smoking cessation therapies: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health* 2006; 6:300 doi: 10.1186/1471-2458-6-300.

USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS - 1.0216.0209 - A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. * MARCA DEPOSITADA

Soúde para uma vida melhor

Você pode virar essa página

ANÚNCIO DIRIGIDO À CLASSE MÉDICA - INFORMAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO NO CORPO DESTA PUBLICAÇÃO