

Comissão discute programação do 63º congresso brasileiro

Em março, a Comissão Executiva e Científica do 63º Congresso Brasileiro de Cardiologia teve novo encontro para discutir a programação e dar continuidade à organização do evento. Já foram realizadas duas reuniões, em janeiro e fevereiro, nas sedes da SBC de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente, onde foram discutidas as sugestões encaminhadas pelos departamentos científicos e pelas sociedades estaduais e regionais da entidade.

O evento será realizado de 6 a 10 de setembro, no Expotrade Convention Center de Curitiba (PR). Já estão confirmadas as presenças do professor norte-americano Valentin Fuster, que abrirá o evento, e da Dra. Catherine Otto, também dos Estados Unidos.

Desconto na inscrição

O primeiro prazo para inscrições, com preços mais acessíveis, termina no dia 31 de março. Os interessados devem acessar o endereço:

<http://congresso.cardiol.br/63/inscricoes.asp>

Hospedagem e turismo em Curitiba

No portal do congresso, também já é possível consultar a lista de hotéis para os congressistas e informações sobre passagens aéreas e também sobre as atrações turísticas de Curitiba. Acesse <http://congresso.cardiol.br/63/> e clique no link Agência Oficial - Congressista.



Tabagismo tratado no lugar certo^{1,2}

CHAMPIX* O poder para parar³⁻⁷

tartarato de vareniclina

Champix* oferece chance **16** vez maior de permanecer abstinente após um ano vs TRN, quando comparados ao placebo⁸

12 semanas de tratamento completo^{3,4}

4x mais chances de parar comparado ao placebo^{3,4}
(odds ratios (OR): Gonzales et al = 3,85; Jorenby et al = 3,85)^{3,4}

2x mais chances de parar comparado à bupropiona SR^{3,4}
(odds ratios (OR): Gonzales et al = 1,93; Jorenby et al = 1,90)^{3,4}

Fale Pfizer
0800-16-7575
www.pfizer.com.br
falepfizer@pfizer.com

Referências Bibliográficas: 1. Raw M, Andersen P, Batra A, for the World Health Organization European Partnership Project to Reduce Tobacco Dependence. WHO Europe evidence based recommendations on the treatment of tobacco dependence. Tob Control 2002; 11:44-46; 2. INCA (Instituto Nacional do Câncer). Website: www.inca.gov.br; 3. Gonzales D, Rennard SI, Nides M, et al, for the Varenicline Phase 3 Study Group. Varenicline, an α , β nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:47-55; 4. Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA, et al, for the Varenicline Phase 3 Study Group. Efficacy of varenicline, α , β nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:56-63; 5. Tonstad S, Tonnesen P, Hajeck P, Williams KE, Billing CB, Reeves KR, for the Varenicline Phase 3 Study Group. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:64-71; 6. Gillian M, Keating M, Asif A, Siddiqui. Varenicline: A Review of its Use as an Aid to Smoking Cessation Therapy. CNS Drugs 2006; 20 (11): 945-960; 7. Bula do produto aprovada pela Anvisa; 8. Ping Wu, Kumanan Wilson, Popey Dimoulas and Edward J Mills. Effectiveness of smoking cessation therapies: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2006; 6:300 doi: 10.1186/1471-2458-6-300.

USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS - 1.0216.0209 - A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.* MARCA DEPOSITADA



Saúde para uma vida melhor

Você pode virar essa página

ANÚNCIO DIRIGIDO À CLASSE MÉDICA. INFORMAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO NO CORPO DESTA PUBLICAÇÃO