

Insuficiência cardíaca na Internet

O conhecimento sobre a insuficiência cardíaca melhorou muito nos últimos anos, permitindo um melhor entendimento da fisiopatologia, do diagnóstico, da história natural e do tratamento.

Novos biomarcadores, que auxiliam na classificação e monitorização terapêutica, e novas drogas e modalidades terapêuticas surgem a cada ano, impondo a necessidade de uma atualização constante por parte dos cardiologistas.

Na Internet, boas fontes práticas de atualização sobre a insuficiência cardíaca são:

- circheartfailure.ahajournals.org/
- www.heartfailure.org/
- www.heartfailurematters.org
- www.hfsa.org/
- www.ishlt.org/



Responsável
Augusto Uchida
augustohiroshi@cardiol.br

- www.heart-transplant.org/
- www.heart-transplant.co.uk/
- nihseniorhealth.gov/heartfailure/toc.html
- www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials/congestiveheartfailure/htm/index.htm
- www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Hf/HF_WhatIs.html



REDUÇÃO DO COLESTEROL

O que determina a sua escolha?

- Potência na redução do LDL-C ^{2,3,7,8,9}
- Excelente perfil de tolerabilidade ^{5,6}
- Programa Mais Pfizer: 20 e 40 mg ao mesmo custo de 10 mg*

- Flexibilidade de doses iniciais: 10, 20, 40 e 80 mg ^{1,3}
- Evidências na redução de eventos cardiovasculares ¹⁰⁻¹⁸

* O Programa Mais Pfizer foi criado pelos Laboratórios Pfizer para facilitar a adesão ao tratamento medicamentoso prescrito pelo médico. Para obter informações detalhadas ligue gratuitamente para 0800 12 66 44 ou acesse www.maispfizer.com.br. A Pfizer reserva-se o direito de alterar ou interromper o Programa.

Pensando bem, por que escolher outro?



LÍPITOR®

atorvastatina cálcica

Sua escolha desde o início¹⁻⁶



Fale Pfizer
0800-16-7575
www.pfizer.com.br
info@pfizer.com.br



Laboratórios Pfizer Ltda. - Rua Alexandre Dumas, 1860 - São Paulo - SP - CEP 04717-904 CNPJ 46.070.868/0019-98
© Copyright Laboratórios Pfizer Ltda. 2008. Todos os direitos reservados. www.pfizer.com.br



CardioClick
com.br
O site do seu coração

Informes para a prescrição no corpo desta publicação. A persistência dos sintomas ou a piora dos mesmos deverá ser consultado. Uso adulto e pediátrico acima de 10 anos de idade. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS-1.0216.080